

# Безименни термове

Трифон Трифонов

$\lambda$ -смятане и теория на доказателствата, 2018/19 г.

5–12 март 2019 г.

Проблеми на  $\frac{\alpha}{\equiv}$ 

- Не е удобна за програмна реализация

Проблеми на  $\equiv$ 

- Не е удобна за програмна реализация
- Неконстантна проверка за еквивалентност

Проблеми на  $\stackrel{\alpha}{=}$ 

- Не е удобна за програмна реализация
- Неконстантна проверка за еквивалентност
- Можем ли да сменим синтаксиса като “вградим”  $\stackrel{\alpha}{=}$  така, че да се превърне в  $\equiv$ ?

Проблеми на  $\stackrel{\alpha}{\equiv}$ 

- Не е удобна за програмна реализация
- Неконстантна проверка за еквивалентност
- Можем ли да сменим синтаксиса като “вградим”  $\stackrel{\alpha}{\equiv}$  така, че да се превърне в  $\equiv$ ?
- Трябва да измислим представяне, което “канонизира” свързаните променливи

Проблеми на  $\stackrel{\alpha}{\equiv}$ 

- Не е удобна за програмна реализация
- Неконстантна проверка за еквивалентност
- Можем ли да сменим синтаксиса като “вградим”  $\stackrel{\alpha}{\equiv}$  така, че да се превърне в  $\equiv$ ?
- Трябва да измислим представяне, което “канонизира” свързаните променливи

**Пример:**  $\lambda_x xz(\lambda_y yxz) \stackrel{\alpha}{\equiv} \lambda_u uz(\lambda_v vuz)$

# Граф на $\lambda$ -терм

## Задача

*Да се дефинира формално понятието “граф, съответстващ на  $\lambda$ -терм”.*

# Граф на $\lambda$ -терм

## Задача

*Да се дефинира формално понятието “граф, съответстващ на  $\lambda$ -терм”.  
Да се докаже, че два  $\lambda$ -терма са  $\alpha$ -еквивалентни тогава и само тогава, когато съответните им графи са изоморфни.*



# Изисквания към дефиницията

Устойчивост при:

- прилагане на субституция

# Изисквания към дефиницията

Устойчивост при:

- прилагане на субституция
- разглеждане на подтерм

# Изисквания към дефиницията

Устойчивост при:

- прилагане на субституция
- разглеждане на подтерм
- конструиране на нов терм

# Изисквания към дефиницията

Устойчивост при:

- прилагане на субституция
- разглеждане на подтерм
- конструиране на нов терм

**Идея:** номериране на  $\lambda$ -възлите **отвътре навън**.

# Примери за безименни $\lambda$ -термове

- $\lambda_x x$       $\lambda 0$

Примери за безименни  $\lambda$ -термове

- $\lambda_x x$

- $\lambda_x \lambda_y y$

$$\lambda \lambda 0$$

$$\lambda \lambda 1$$

$$\lambda_{x,y} x$$

# Примери за безименни $\lambda$ -термове

- $\lambda_x x$
- $\lambda_x \lambda_y y$
- $\lambda_x \lambda_y x$

Примери за безименни  $\lambda$ -термове

- $\lambda_x x$
- $\lambda_x \lambda_y y$
- $\lambda_x \lambda_y x$
- $\lambda(\lambda 0)(\lambda 1)$


$$\lambda_x \lambda_z x \stackrel{\alpha}{=} \lambda_{x,y} x$$

$\beta$  ↑

$$\lambda_x (\lambda_y y) (\lambda_z x)$$



Примери за безименни  $\lambda$ -термове

- $\lambda_x x$
  - $\lambda_x \lambda_y y$
  - $\lambda_x \lambda_y x$
  - $\lambda(\lambda 0)(\lambda 1)$
  - $\lambda_x x(\lambda_z z(\lambda_y x y z)x)$
- 

# Свободни променливи

Как да представяме свободните променливи?

- лесно свързване на променливи с еднакви имена при конструиране на нов терм

# Свободни променливи

Как да представяме свободните променливи?

- лесно свързване на променливи с еднакви имена при конструиране на нов терм
- **Идея:** да ги представяме с подходящо число

# Свободни променливи

Как да представяме свободните променливи?

- лесно свързване на променливи с еднакви имена при конструиране на нов терм
- **Идея:** да ги представяме с подходящо число
- **Проблем:** всяко срещане на  $x$  може да е скрито под различен брой  $\lambda$ -абстракции!

# Свободни променливи

Как да представяме свободните променливи?

- лесно свързване на променливи с еднакви имена при конструиране на нов терм
- **Идея:** да ги представяме с подходящо число
- **Проблем:** всяко срещане на  $x$  може да е скрито под различен брой  $\lambda$ -абстракции!
- **Инвариант:** разликата между номера на променливата и броя  $\lambda$ -абстракции, зад които е скрита

# Свободни променливи

Как да представяме свободните променливи?

- лесно свързване на променливи с еднакви имена при конструиране на нов терм
- **Идея:** да ги представяме с подходящо число
- **Проблем:** всяко срещане на  $x$  може да е скрито под различен брой  $\lambda$ -абстракции!
- **Инвариант:** разликата между номера на променливата и броя  $\lambda$ -абстракции, зад които е скрита
- индекс на de Bruijn

# Примери за безименни термове със свободни променливи

- $\lambda_x y$

# Примери за безименни термове със свободни променливи

- $\lambda_x y$
- $y(\lambda_x xyz)z$




# Примери за безименни термове със свободни променливи

- $\lambda_x y$
- $y(\lambda_x xyz)z$
- $(\lambda_x xy(\lambda_u zu(\lambda_v vy)))z$

# Примери за безименни термове със свободни променливи

- $\lambda_x y$
- $y(\lambda_x xyz)z$
- $(\lambda_x xy(\lambda_u zu(\lambda_v vy)))z$
- $\lambda(\lambda 0((\lambda 1)21))1$



$0 \rightarrow z$

# Безименни термове

Дефиниция (Безименни термове,  $\Lambda_n$ ,  $\Lambda^*$ )

С едновременна индукция за всяко  $n$  дефинираме множествата  $\Lambda_n$  от безименни термове с не повече от  $n$  различни свободни променливи.

# Безименни термове

Дефиниция (Безименни термове,  $\Lambda_n$ ,  $\Lambda^*$ )

С едновременна индукция за всяко  $n$  дефинираме множествата  $\Lambda_n$  от безименни термове с не повече от  $n$  различни свободни променливи.

- 1  $i \in \Lambda_n$  за всяко естествено число  $i$ , за което  $0 \leq i < n$ .

# Безименни термове

Дефиниция (Безименни термове,  $\Lambda_n, \Lambda^*$ )

С едновременна индукция за всяко  $n$  дефинираме множествата  $\Lambda_n$  от безименни термове с не повече от  $n$  различни свободни променливи.

- 1  $i \in \Lambda_n$  за всяко естествено число  $i$ , за което  $0 \leq i < n$ .
- 2 Ако  $M, N \in \Lambda_n$ , то  $(MN) \in \Lambda_n$  е апликацията на  $M$  над  $N$ .

Ако  $M \in \Lambda_{n+1}$ , то  $(\lambda M) \in \Lambda_n$

# Безименни термове

## Дефиниция (Безименни термове, $\Lambda_n$ , $\Lambda^*$ )

С едновременна индукция за всяко  $n$  дефинираме множествата  $\Lambda_n$  от безименни термове с не повече от  $n$  различни свободни променливи.

- 1  $i \in \Lambda_n$  за всяко естествено число  $i$ , за което  $0 \leq i < n$ .
- 2 Ако  $M, N \in \Lambda_n$ , то  $(MN) \in \Lambda_n$  е апликацията на  $M$  над  $N$ .
- 3 Ако  $M \in \Lambda_{n+1}$ , то  $(\lambda M) \in \Lambda_n$  е абстракцията над променливата с индекс 0 в  $M$ .

# Безименни термове

## Дефиниция (Безименни термове, $\Lambda_n$ , $\Lambda^*$ )

С едновременна индукция за всяко  $n$  дефинираме множествата  $\Lambda_n$  от безименни термове с не повече от  $n$  различни свободни променливи.

- 1  $i \in \Lambda_n$  за всяко естествено число  $i$ , за което  $0 \leq i < n$ .
- 2 Ако  $M, N \in \Lambda_n$ , то  $(MN) \in \Lambda_n$  е апликацията на  $M$  над  $N$ .
- 3 Ако  $M \in \Lambda_{n+1}$ , то  $(\lambda M) \in \Lambda_n$  е абстракцията над променливата с индекс 0 в  $M$ .

С  $\Lambda^* := \bigcup_{n=0}^{\infty} \Lambda_n$  отбелязваме множеството на всички безименни  $\lambda$ -термове.

# Безименни термове

## Дефиниция (Безименни термове, $\Lambda_n$ , $\Lambda^*$ )

С едновременна индукция за всяко  $n$  дефинираме множествата  $\Lambda_n$  от безименни термове с не повече от  $n$  различни свободни променливи.

- 1  $i \in \Lambda_n$  за всяко естествено число  $i$ , за което  $0 \leq i < n$ .
- 2 Ако  $M, N \in \Lambda_n$ , то  $(MN) \in \Lambda_n$  е апликацията на  $M$  над  $N$ .
- 3 Ако  $M \in \Lambda_{n+1}$ , то  $(\lambda M) \in \Lambda_n$  е абстракцията над променливата с индекс 0 в  $M$ .

С  $\Lambda^* := \bigcup_{n=0}^{\infty} \Lambda_n$  отбелязваме множеството на всички безименни  $\lambda$ -термове.

## Задача

Ако  $m < n$ , то  $\Lambda_m \subsetneq \Lambda_n$ .



# Безименни термове

## Дефиниция (Безименни термове, $\Lambda_n$ , $\Lambda^*$ )

С едновременна индукция за всяко  $n$  дефинираме множествата  $\Lambda_n$  от безименни термове с не повече от  $n$  различни свободни променливи.

- 1  $i \in \Lambda_n$  за всяко естествено число  $i$ , за което  $0 \leq i < n$ .
- 2 Ако  $M, N \in \Lambda_n$ , то  $(MN) \in \Lambda_n$  е апликацията на  $M$  над  $N$ .
- 3 Ако  $M \in \Lambda_{n+1}$ , то  $(\lambda M) \in \Lambda_n$  е абстракцията над променливата с индекс 0 в  $M$ .

С  $\Lambda^* := \bigcup_{n=0}^{\infty} \Lambda_n$  отбелязваме множеството на всички безименни  $\lambda$ -термове.

## Задача

Ако  $m < n$ , то  $\Lambda_m \subsetneq \Lambda_n$ .

Можем да проверим, че  $\Lambda^*$  е изоморфно на  $\Lambda_{\aleph_0}$ .

## Изтриване и добавяне на имена

Ще дефинираме две изображения:

## Изтриване и добавяне на имена

Ще дефинираме две изображения:

- $\#(M)$  — добавя имена към безименния терм  $M$

## Изтриване и добавяне на имена

Ще дефинираме две изображения:

- $\#(M)$  — добавя имена към безименния терм  $M$
- $\flat(M)$  — изтрива имената на  $\lambda$ -терма  $M$

## Изтриване и добавяне на имена

Ще дефинираме две изображения:

- $\sharp(M)$  — добавя имена към безименния терм  $M$
- $\flat(M)$  — изтрива имената на  $\lambda$ -терма  $M$

### Дефиниция (Контекст от имена)

Крайна редица от различни променливи  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0 \in V$  ще наричаме *контекст от имена*.

## Изтриване и добавяне на имена

Ще дефинираме две изображения:

- $\#(M)$  — добавя имена към безименния терм  $M$
- $\flat(M)$  — изтрива имената на  $\lambda$ -терма  $M$

### Дефиниция (Контекст от имена)

Крайна редица от различни променливи  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0 \in V$  ще наричаме *контекст от имена*.

Дължината на контекста ще бележим с  $|\Gamma| := n$ , а множеството  $\text{dom } \Gamma := \{x_{n-1}, \dots, x_0\}$  ще наричаме *домейн на контекста*.

## Изтриване и добавяне на имена

Ще дефинираме две изображения:

- $\#(M)$  — добавя имена към безименния терм  $M$
- $\flat(M)$  — изтрива имената на  $\lambda$ -терма  $M$

### Дефиниция (Контекст от имена)

Крайна редица от различни променливи  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0 \in V$  ще наричаме *контекст от имена*.

Дължината на контекста ще бележим с  $|\Gamma| := n$ , а множеството  $\text{dom } \Gamma := \{x_{n-1}, \dots, x_0\}$  ще наричаме *домейн на контекста*.

При даден контекст  $\Gamma$ , ще казваме, че променливата  $x_i$  има индекс  $i$ .

Изоморфизъм между  $\Lambda_{/\equiv}^{\alpha}$  и  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $X \subseteq V$  е множество от променливи. Дефинираме  $\Lambda_X := \{M \in \Lambda \mid FV(M) \subseteq X\}$ .



# Изоморфизъм между $\Lambda_{/\alpha}$ и $\Lambda^*$

## Дефиниция

Нека  $X \subseteq V$  е множество от променливи. Дефинираме  $\Lambda_X := \{M \in \Lambda \mid FV(M) \subseteq X\}$ .

## Задача

Да се дефинират фамилиите от изображения  $\sharp_\Gamma : \Lambda_{|\Gamma|} \rightarrow \Lambda_{\text{dom } \Gamma}$  и  $\flat_\Gamma : \Lambda_{\text{dom } \Gamma} \rightarrow \Lambda_{|\Gamma|}$  за даден контекст от имена  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0$ , които извършват превод между термове с имена и безименни термове.

# Изоморфизъм между $\Lambda_{/\alpha}$ и $\Lambda^*$

## Дефиниция

Нека  $X \subseteq V$  е множество от променливи. Дефинираме  $\Lambda_X := \{M \in \Lambda \mid FV(M) \subseteq X\}$ .

## Задача

Да се дефинират фамилиите от изображения  $\sharp_\Gamma : \Lambda_{|\Gamma|} \rightarrow \Lambda_{\text{dom } \Gamma}$  и  $\flat_\Gamma : \Lambda_{\text{dom } \Gamma} \rightarrow \Lambda_{|\Gamma|}$  за даден контекст от имена  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0$ , които извършват превод между термове с имена и безименни термове. Да се покаже, че:

- 1  $\sharp_\Gamma(\flat_\Gamma(M)) \stackrel{\alpha}{=} M$  за всеки терм  $M \in \Lambda_{\text{dom } \Gamma}$

# Изоморфизъм между $\Lambda_{/\alpha}$ и $\Lambda^*$

## Дефиниция

Нека  $X \subseteq V$  е множество от променливи. Дефинираме  $\Lambda_X := \{M \in \Lambda \mid FV(M) \subseteq X\}$ .

## Задача

Да се дефинират фамилиите от изображения  $\sharp_\Gamma : \Lambda_{|\Gamma|} \rightarrow \Lambda_{\text{dom } \Gamma}$  и  $b_\Gamma : \Lambda_{\text{dom } \Gamma} \rightarrow \Lambda_{|\Gamma|}$  за даден контекст от имена  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0$ , които извършват превод между термове с имена и безименни термове. Да се покаже, че:

- ①  $\sharp_\Gamma(b_\Gamma(M)) \stackrel{\alpha}{\equiv} M$  за всеки терм  $M \in \Lambda_{\text{dom } \Gamma}$
- ②  $b_\Gamma(\sharp_\Gamma(M)) \equiv M$  за всеки терм  $M \in \Lambda_{|\Gamma|}$

Субституция в  $\lambda^*$ 

Какъв би трябвало да е резултатът от:

- $\lambda 01[1] \mapsto \lambda 0] \equiv \lambda 01$   
 $[z \mapsto \lambda y y]$

$$\#_{\lambda, x}(\lambda 01) \equiv \lambda y y x$$

Субституция в  $\lambda^*$ 

Какъв би трябвало да е резултатът от:

- $\lambda 0 1 [1 \mapsto \lambda 0]$

- $\lambda 0 1 [0 \mapsto \lambda 0] \equiv \overset{n}{\lambda 0} (\overset{n}{\lambda 0})$

$$(\lambda y z x) [x \mapsto \lambda u] \equiv \lambda y z (\lambda u u)$$

Субституция в  $\lambda^*$ 

Какъв би трябвало да е резултатът от:

- $\lambda 0 1 [1 \mapsto \lambda 0]$

- $\lambda 0 1 [0 \mapsto \lambda 0]$

- $0(\lambda 0 1)[0 \mapsto \lambda 0] \equiv$

$$(\lambda 0)(\lambda 0 (\lambda 0))$$

$$(\lambda_x x)(\lambda_y y (\lambda_z z))$$

Субституция в  $\lambda^*$ 

Какъв би трябвало да е резултатът от:

- $\lambda 0 1 [1 \mapsto \lambda 0]$
- $\lambda 0 1 [0 \mapsto \lambda 0]$
- $0(\lambda 0 1)[0 \mapsto \lambda 0]$
- $0(\lambda 0 1)[0 \mapsto 1] \equiv 1(\lambda 0 2)$

$$i [j \mapsto N] := \begin{cases} N & , i=j \\ i & , i \neq j \end{cases}$$

$$(M_1 M_2) [i \mapsto N] :=$$

$$\begin{aligned} & (M_1 [i \mapsto N]) \\ & (M_2 [i \mapsto N]) \end{aligned}$$

$$(\lambda M) [i \mapsto N] :=$$

$$:= \lambda (M' [i+1 \mapsto \uparrow^+ N])$$

$$\uparrow^{\lambda} (i) := i+1$$

$$\uparrow^{\lambda} (M_1 M_2) := (\uparrow^{\lambda} M_1) \mid \uparrow^{\lambda} M_2$$

$$\uparrow^{\lambda} (\lambda M') := \lambda (\uparrow^{\lambda} M')$$



Субституция в  $\lambda^*$ 

Какъв би трябвало да е резултатът от:

- $\lambda 0 1 [1 \mapsto \lambda 0]$
- $\lambda 0 1 [0 \mapsto \lambda 0]$
- $0(\lambda 0 1)[0 \mapsto \lambda 0]$
- $0(\lambda 0 1)[0 \mapsto 1]$
- $0(\lambda 0 1)[0 \mapsto \lambda 0 1] \equiv \lambda 0 1 (\lambda 0 (\lambda 0 2))$

# Изместване

## Дефиниция (Изместване)

Дефинираме  $\uparrow_c^d (M) : \Lambda_n \rightarrow \Lambda_{n+d}$ :

$$\textcircled{1} \uparrow_c^d (k) := \begin{cases} k, & \text{за } 0 \leq k < c, \\ k + d, & \text{за } c \leq k < n. \end{cases}$$

## Изместване

## Дефиниция (Изместване)

Дефинираме  $\uparrow_c^d (M) : \Lambda_n \rightarrow \Lambda_{n+d}$ :

- $\uparrow_c^d (k) := \begin{cases} k, & \text{за } 0 \leq k < c, \\ k + d, & \text{за } c \leq k < n. \end{cases}$
- $\uparrow_c^d (M_1 M_2) := (\uparrow_c^d (M_1))(\uparrow_c^d (M_2))$

## Изместване

## Дефиниция (Изместване)

Дефинираме  $\uparrow_c^d (M) : \Lambda_n \rightarrow \Lambda_{n+d}$ :

- 1  $\uparrow_c^d (k) := \begin{cases} k, & \text{за } 0 \leq k < c, \\ k + d, & \text{за } c \leq k < n. \end{cases}$
- 2  $\uparrow_c^d (M_1 M_2) := (\uparrow_c^d (M_1))(\uparrow_c^d (M_2))$
- 3  $\uparrow_c^d (\lambda N) := \lambda \uparrow_{c+1}^d (N)$

## Изместване

## Дефиниция (Изместване)

Дефинираме  $\uparrow_c^d (M) : \Lambda_n \rightarrow \Lambda_{n+d}$ :

$$\textcircled{1} \quad \uparrow_c^d (k) := \begin{cases} k, & \text{за } 0 \leq k < c, \\ k + d, & \text{за } c \leq k < n. \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad \uparrow_c^d (M_1 M_2) := (\uparrow_c^d (M_1))(\uparrow_c^d (M_2))$$

$$\textcircled{3} \quad \uparrow_c^d (\lambda N) := \lambda \uparrow_{c+1}^d (N)$$

Дефинираме  $\uparrow^d (M) := \uparrow_0^d (M)$ .

# Субституция в $\Lambda^*$

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

# Субституция в $\Lambda^*$

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

①  $k[k \mapsto M] := N$

Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- 1  $k[k \mapsto M] := N$
- 2  $i[k \mapsto M] := i$  за  $i \neq k$



Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- 1  $k[k \mapsto N] := N$
- 2  $i[k \mapsto N] := i$  за  $i \neq k$
- 3  $(M_1 M_2)[k \mapsto N] := (M_1[k \mapsto N])(M_2[k \mapsto N])$

Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- 1  $k[k \mapsto N] := N$
- 2  $i[k \mapsto N] := i$  за  $i \neq k$
- 3  $(M_1 M_2)[k \mapsto N] := (M_1[k \mapsto N])(M_2[k \mapsto N])$
- 4  $(\lambda M)[k \mapsto N] := \lambda(M[k + 1 \mapsto \uparrow^1(N)])$

Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- ①  $k[k \mapsto N] := N$
- ②  $i[k \mapsto N] := i$  за  $i \neq k$
- ③  $(M_1 M_2)[k \mapsto N] := (M_1[k \mapsto N])(M_2[k \mapsto N])$
- ④  $(\lambda M)[k \mapsto N] := \lambda(M[k + 1 \mapsto \uparrow^1(N)])$

Примери:

Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- ①  $k[k \mapsto N] := N$
- ②  $i[k \mapsto N] := i$  за  $i \neq k$
- ③  $(M_1 M_2)[k \mapsto N] := (M_1[k \mapsto N])(M_2[k \mapsto N])$
- ④  $(\lambda M)[k \mapsto N] := \lambda(M[k + 1 \mapsto \uparrow^1(N)])$

## Примери:

- $(y(\lambda_x x y z)z)[y \mapsto z y]$

Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- 1  $k[k \mapsto N] := N$
- 2  $i[k \mapsto N] := i$  за  $i \neq k$
- 3  $(M_1 M_2)[k \mapsto N] := (M_1[k \mapsto N])(M_2[k \mapsto N])$
- 4  $(\lambda M)[k \mapsto N] := \lambda(M[k + 1 \mapsto \uparrow^1(N)])$

## Примери:

- $(y(\lambda_x xyz)z)[y \mapsto zy]$
- $0(\lambda 013)2[0 \mapsto 20]$

Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- 1  $k[k \mapsto N] := N$
- 2  $i[k \mapsto N] := i$  за  $i \neq k$
- 3  $(M_1 M_2)[k \mapsto N] := (M_1[k \mapsto N])(M_2[k \mapsto N])$
- 4  $(\lambda M)[k \mapsto N] := \lambda(M[k + 1 \mapsto \uparrow^1(N)])$

## Примери:

- $(y(\lambda_x x y z) z)[y \mapsto z y]$
- $0(\lambda 0 1 3) 2[0 \mapsto 2 0]$
- $y(\lambda_x x y (\lambda_u u x y))[y \mapsto z(\lambda_v v y z)]$

Субституция в  $\Lambda^*$ 

## Дефиниция

Нека  $M, N \in \Lambda_n$  и  $k \in \mathbb{N}$ .

- 1  $k[k \mapsto N] := N$
- 2  $i[k \mapsto N] := i$  за  $i \neq k$
- 3  $(M_1 M_2)[k \mapsto N] := (M_1[k \mapsto N])(M_2[k \mapsto N])$
- 4  $(\lambda M)[k \mapsto N] := \lambda(M[k + 1 \mapsto \uparrow^1(N)])$

## Примери:

- $(y(\lambda_x x y z) z)[y \mapsto z y]$
- $0(\lambda 0 1 3) 2[0 \mapsto 2 0]$
- $y(\lambda_x x y (\lambda_u u x y))[y \mapsto z(\lambda_v v y z)]$
- $0(\lambda 0 1(\lambda 0 1 2))[0 \mapsto 2(\lambda 0 1 3)]$

# Съвместимост на субституциите

## Задача

*Да се провери, че двете дефиниции за субституции са съгласувани относно изображенията  $\#_{\Gamma}$  и  $b_{\Gamma}$ .*



# Съвместимост на субституциите

## Задача

*Да се провери, че двете дефиниции за субституции са съгласувани относно изображенията  $\#_{\Gamma}$  и  $b_{\Gamma}$ .*

*За целта, нека фиксираме контекст от имена  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0$ .*

# Съвместимост на субституциите

## Задача

Да се провери, че двете дефиниции за субституции са съгласувани относно изображенията  $\#_{\Gamma}$  и  $\flat_{\Gamma}$ .

За целта, нека фиксираме контекст от имена  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0$ .

Да се покаже, че

$$\textcircled{1} \quad \#_{\Gamma}(M)[x_i \mapsto \#_{\Gamma}(N)] \stackrel{\alpha}{=} \#_{\Gamma}(M[i \mapsto N]) \text{ за произволни } M, N \in \Lambda_n,$$

# Съвместимост на субституциите

## Задача

Да се провери, че двете дефиниции за субституции са съгласувани относно изображенията  $\sharp_{\Gamma}$  и  $\flat_{\Gamma}$ .

За целта, нека фиксираме контекст от имена  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0$ .

Да се покаже, че

- 1  $\sharp_{\Gamma}(M)[x_i \mapsto \sharp_{\Gamma}(N)] \stackrel{\alpha}{=} \sharp_{\Gamma}(M[i \mapsto N])$  за произволни  $M, N \in \Lambda_n$ ,
- 2  $\flat_{\Gamma}(M)[i \mapsto \flat_{\Gamma}(N)] \equiv \flat_{\Gamma}(M[x_i \mapsto N])$  за произволни  $M, N \in \Lambda_{\text{dom } \Gamma}$ .

## Съвместимост на субституциите

### Задача

Да се провери, че двете дефиниции за субституции са съгласувани относно изображенията  $\#_{\Gamma}$  и  $b_{\Gamma}$ .

За целта, нека фиксираме контекст от имена  $\Gamma := x_{n-1}, \dots, x_0$ .

Да се покаже, че

- 1  $\#_{\Gamma}(M)[x_i \mapsto \#_{\Gamma}(N)] \stackrel{\alpha}{=} \#_{\Gamma}(M[i \mapsto N])$  за произволни  $M, N \in \Lambda_n$ ,
- 2  $b_{\Gamma}(M)[i \mapsto b_{\Gamma}(N)] \equiv b_{\Gamma}(M[x_i \mapsto N])$  за произволни  $M, N \in \Lambda_{\text{dom } \Gamma}$ .

### Задача

Да се направи програмна реализация на субституция над безименни термове.