

Числени методи, СИ и ИС, втори курс,
2018/2019

Допълнителни задачи за подготовка за контролна
работка № 1

Задача 1. Относителната плътност на въздуха ρ е измерена на различна височина с висока точност. Резултатите от измерванията са систематизирани в следната таблица:

$h, \text{ km}$	0	1.525	3.05	4.575	6.1
ρ	1	0.8617	0.7385	0.6292	0.5328

Като използвате интерполяционната формула на Лагранж и система Mathematica, определете приблизително каква е относителната плътност на височина 3 км. (Възлите на интерполяция да се вземат от автоматично генериран по подходящ начин списък, а базисните полиноми да са написани явно, т.е. без да се използват вече дефинираните за това функции).

Илюстрирайте графично как ρ се изменя, в зависимост от височината, като построите графиката на полинома и точките в една координатна система.

Задача 2. Като използвате метода на неопределенните коефициенти (т.е. като решите съответната линейна система за коефициентите), намерете полином, удовлетворяващ интерполяционните условия

$$P(0) = 1, P'(0) = 0, P(1) = 2, P'(1) = 6, P(2) = 21.$$

Задача 3. Да се приближи функцията $f(x) = \cos x$:

- като се намери интерполяционният полином на Лагранж с възли $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$;
- като се намери интерполяционният полином на Ермит с възли $0, \frac{\pi}{2}$ и съответстващи и кратности – 2 и 1.
- Да се построят графиките на относителните грешки (по абсолютна стойност) в интервала на интерполяция за двета случая. Да се сравни къде апроксимацията е по-добра.

Забележка. Да не се използва вградената функция InterpolatingPolynomial.

Задача 4. Дадена е функцията $f(x) = \ln x$. Построен е интерполяционният полином на Лагранж $L_3(f; x)$. Намерете оценката на грешката $R(x) = |f(x) - L_3(f; x)|$ в интервала $[x_0, x_3]$, като използвате Теоремата за оценка на грешката, и постройте графиката ѝ. Възлите на интерполяция са:

- $x_0 = -1, x_1 = -0.3, x_2 = 0.3, x_3 = 1;$
- Чебишовите възли в интервала $[-1, 1]$.

В кой случай оценката на грешката е по-добра? Защо?

Задача 5. Да се дефинира функция $NewtonForward[n, x0, h, f]$, която построява интерполяционния полином на Лагранж от степен n за функцията $f(x)$ с възли $\{x_i = x_0 + ih, i = \overline{0, n}\}$, като използва формулата на Нютон за интерполиране напред. Решението да е итеративно (да не се използват вградените в Mathematica функции за намиране на сума).

Задача 6. Да се дефинира функция $Newton[n, x0, h, f]$, която построява интерполяционния полином на Лагранж от степен n за функцията $f(x)$ с възли $\{x_i = x_0 + ih, i = \overline{0, n}\}$, като използва формулата на Нютон с разделени разлики. Решението да е итеративно (да не се използват вградените в Mathematica функции за намиране на сума).

Задача 7. Да се дефинира функция $Lagrange[n, x0, h, f]$, която построява интерполяционния полином на Лагранж от степен n за функцията $f(x)$ с възли $\{x_i = x_0 + ih, i = \overline{0, n}\}$, като използва формулата на Лагранж. Решението да е итеративно (да не се използват вградените в Mathematica функции за намиране на сума).

Забележка. Горните три задачи да се тестват с данните от Задача 1. Уверете се, че получавате еднакви резултати.

Задача 8. Дадени са стойности в 5 точки от сигнал от даден акселерометър (сензор, измерващ линейно ускорение). След подходяща смяна на мерната единица, сигналът се описва от периодична функция с период $T = 2\pi$. Да се намери обобщен полином по подходящ базис, интерполиращ тези точки. Да се илюстрира графично, като се визуализират точките и графиката на полинома в една координатна система.

t, ms	0	1.5	3	4	6
ускорение, m/s^2	0	1	1.5	4	2

Задача 9. Дадени са данни за усвояването на лекарство от организма. В таблицата е дадена концентрацията на лекарството в кръвта, като функция на времето. Да се намери обобщен полином по подходящ базис, който описва процеса.

t, h	0	2	4	6	8
концентрация, %	0.1	0.009	0.0011	0.00003	0.0000012

Примерни базиси за последните две задачи:

1. $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$,
2. $\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx\}$,
3. $\{1, e^x, e^{2x}, \dots, e^{nx}\}$,
4. $\{1/(1+x), 1/(2+x), \dots, 1/(n+x)\}$,
5. $\{1, e^{-x}, e^{-2x}, \dots, e^{-nx}\}$,
6. $\{1/(1-x), 1/(2-x), \dots, 1/(n-x)\}$.