

Следващата теорема показва, съответствие между затворените термове и техните стойности в структурата.

Твърдение 3.1. Нека \mathfrak{A} е структура за \mathcal{L} и нека \mathbf{b} е затворен терм на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}}$, каго $\mathfrak{A}(\mathbf{b}) \equiv \beta$. Нека \mathbf{a} е терм на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}}$ с променливи измежду \mathbf{x} , а \mathbf{A} е формула на \mathcal{L} с променливи измежду \mathbf{x} . Тогава

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) &\equiv \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]); \\ \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) &\equiv \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]).\end{aligned}$$

Доказателство. Ще докажем първото твърдение с индукция по построението на \mathbf{a} . Ако \mathbf{a} не съдържа \mathbf{x} , твърдението е очевидно. Нека сега \mathbf{a} съдържа \mathbf{x} . Ако $\mathbf{a} \equiv \mathbf{x}$, то $\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}] \equiv \mathbf{b}$, $\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}] \equiv \mathbf{b}$ и твърдението следва директно от условието на твърдението. Нека, накрая, $\mathbf{a} \equiv \mathbf{f}\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_n$ за някой n -местен функционален символ \mathbf{f} и термове $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}}$ с променливи измежду \mathbf{x} . Тогава предвид дефиницията на стойност на терм и индукционното предположение имаме

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) &\equiv \mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_{1_{\mathbf{x}}}[\mathbf{b}]), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{n_{\mathbf{x}}}[\mathbf{b}])) \\ &\equiv \mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_{1_{\mathbf{x}}}[\mathbf{i}_{\beta}]), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{n_{\mathbf{x}}}[\mathbf{i}_{\beta}])) \equiv \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]).\end{aligned}$$

Второто твърдение ще докажем с индукция по построението на \mathbf{A} . Нека първо \mathbf{A} е $\mathbf{a} = \mathbf{c}$ за някои термове \mathbf{a} и \mathbf{c} на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}}$ с променливи измежду \mathbf{x} . Тогава предвид твърдението за термове имаме

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{T} &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathfrak{A}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \\ &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathfrak{A}(\mathbf{c}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \iff \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{T}.\end{aligned}$$

Нека сега \mathbf{A} е $\mathbf{p}\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_n$ за някой n -местен нелогически предикатен символ \mathbf{p} и термове $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}}$ с променливи измежду \mathbf{x} . Тогава предвид твърдението за термове и дефиницията на стойност на формула имаме

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{T} &\iff (\mathfrak{A}(\mathbf{a}_{1_{\mathbf{x}}}[\mathbf{b}]), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{n_{\mathbf{x}}}[\mathbf{b}])) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{A}} \\ &\iff (\mathfrak{A}(\mathbf{a}_{1_{\mathbf{x}}}[\mathbf{i}_{\beta}]), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_{n_{\mathbf{x}}}[\mathbf{i}_{\beta}])) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{A}} \iff \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{T}.\end{aligned}$$

Ако $\mathbf{A} \equiv \neg\mathbf{B}$, то \mathbf{B} е формула със свободни променливи измежду \mathbf{x} и предвид индукционното предположение имаме

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{T} &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{F} \\ &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{F} \iff \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{T}.\end{aligned}$$

Ако $\mathbf{A} \equiv \mathbf{B} \vee \mathbf{C}$, то \mathbf{B} и \mathbf{C} са формули със свободни променливи измежду \mathbf{x} и предвид индукционното предположение имаме

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{F} &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathfrak{A}(\mathbf{C}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{F} \\ &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathfrak{A}(\mathbf{C}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{F} \iff \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{F}.\end{aligned}$$

Накрая, нека $\mathbf{A} \equiv \exists \mathbf{y}\mathbf{B}$. Тогава \mathbf{B} е формула със свободни променливи измежду \mathbf{x} , \mathbf{y} . Ако $\mathbf{x} \equiv \mathbf{y}$, то тогава

$$\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}] \equiv \mathbf{A} \equiv \mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]$$

и твърдението е очевидно. Ако $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$, то тогава

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{T} &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{y}}[\mathbf{i}_{\alpha}]_{\mathbf{x}}[\mathbf{b}]) \equiv \mathbb{T} \text{ за някое } \alpha \in |\mathfrak{A}| \\ &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{y}}[\mathbf{i}_{\alpha}]_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{T} \text{ за някое } \alpha \in |\mathfrak{A}| \\ &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{T}.\end{aligned}$$

□

3.2 Изоморфни структури

Нека \mathfrak{A} и \mathfrak{B} са структури за езика \mathcal{L} . Ще казваме, че \mathfrak{A} и \mathfrak{B} са *изоморфни* и ще пишем $\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$, ако съществува биекция $\varphi : |\mathfrak{A}| \rightarrow |\mathfrak{B}|$, такава че

- (i) $\varphi(\mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) \equiv \mathbf{f}_{\mathfrak{B}}(\varphi(\alpha_1), \dots, \varphi(\alpha_n))$ за всеки n -местен функционален символ \mathbf{f} на \mathcal{L} и $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in |\mathfrak{A}|$;
- (ii) $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{A}} \iff (\varphi(\alpha_1), \dots, \varphi(\alpha_n)) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{B}}$ за всеки n -местен нелогически предикатен символ \mathbf{f} на \mathcal{L} и $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in |\mathfrak{A}|$

Биекцията φ наричаме изоморфизъм на \mathfrak{A} върху \mathfrak{B} . С директна проверка се установява, че $\text{id}_{\mathfrak{A}}$ е изоморфизъм на \mathfrak{A} върху \mathfrak{A} , ако φ е изоморфизъм на \mathfrak{A} върху \mathfrak{B} , то φ^{-1} е изоморфизъм на \mathfrak{B} върху \mathfrak{A} , и ако φ е изоморфизъм на \mathfrak{A} върху \mathfrak{B} , а ψ е изоморфизъм на \mathfrak{B} върху \mathfrak{C} , то $\psi \circ \varphi$ е изоморфизъм на \mathfrak{A} върху \mathfrak{C} . В частност

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &\cong \mathfrak{A} \\ \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} &\implies \mathfrak{B} \cong \mathfrak{A} \\ \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \text{ и } \mathfrak{B} \cong \mathfrak{C} &\implies \mathfrak{A} \cong \mathfrak{C}. \end{aligned}$$

Теорема 3.2. Нека \mathfrak{A} и \mathfrak{B} са структури за езика \mathcal{L} и нека φ е изоморфизъм на \mathfrak{A} върху \mathfrak{B} . Нека \mathbf{a} е терм на \mathcal{L} с променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ и \mathbf{A} е формула на \mathcal{L} със свободни променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Тогава за всеки избор на $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in |\mathfrak{A}|$ е в сила

$$\begin{aligned} \varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\alpha_1}, \dots, \mathbf{i}_{\alpha_n}])) &\equiv \mathfrak{B}(\mathbf{a}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\varphi(\alpha_1)}, \dots, \mathbf{i}_{\varphi(\alpha_n)}]) \\ \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\alpha_1}, \dots, \mathbf{i}_{\alpha_n}])) &\equiv \mathfrak{B}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\varphi(\alpha_1)}, \dots, \mathbf{i}_{\varphi(\alpha_n)}]) \end{aligned}$$

Доказателство. Въвеждаме следните означения. Ще пишем

- $\mathbf{a}[\bar{\alpha}]$ вместо $\mathbf{a}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\alpha_1}, \dots, \mathbf{i}_{\alpha_n}]$;
- $\mathbf{a}[\overline{\varphi(\alpha)}]$ вместо $\mathbf{a}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\varphi(\alpha_1)}, \dots, \mathbf{i}_{\varphi(\alpha_n)}]$;
- $\mathbf{A}[\bar{\alpha}]$ вместо $\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\alpha_1}, \dots, \mathbf{i}_{\alpha_n}]$;
- $\mathbf{A}[\overline{\varphi(\alpha)}]$ вместо $\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\varphi(\alpha_1)}, \dots, \mathbf{i}_{\varphi(\alpha_n)}]$.

Ще докажем първото твърдение с индукция по построението на \mathbf{a} . Ако $\mathbf{a} \equiv \mathbf{x}_k$, то тогава

$$\begin{aligned} \varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}[\bar{\alpha}])) &\equiv \varphi(\alpha_k) \\ &\equiv \mathfrak{B}(\mathbf{a}[\overline{\varphi(\alpha)}]). \end{aligned}$$

Нека сега $\mathbf{a} \equiv \mathbf{f}\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_m$ за някой m -местен функционален символ \mathbf{f} и термове $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ на \mathcal{L} с променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Тогава предвид индукционното предположение

$$\begin{aligned} \varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}[\bar{\alpha}])) &\equiv \varphi(\mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1[\bar{\alpha}]), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_m[\bar{\alpha}]))) \\ &\equiv \mathbf{f}_{\mathfrak{B}}(\varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1[\bar{\alpha}])), \dots, \varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_m[\bar{\alpha}]))) \\ &\equiv \mathbf{f}_{\mathfrak{B}}(\mathfrak{B}(\mathbf{a}_1[\overline{\varphi(\alpha)}]), \dots, \mathfrak{B}(\mathbf{a}_m[\overline{\varphi(\alpha)}])) \\ &\equiv \mathfrak{B}(\mathbf{a}[\overline{\varphi(\alpha)}]). \end{aligned}$$

Второто твърдение ще докажем с индукция по построението на \mathbf{A} . Нека първо \mathbf{A} е $\mathbf{a} = \mathbf{b}$, където \mathbf{a} и \mathbf{b} са термове на \mathcal{L} с променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Тогава предвид свойството на φ по отношение на предикатните символи и твърдението за термове имаме

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}(\mathbf{A}[\bar{\alpha}]) \equiv \mathbb{T} &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{a}[\bar{\alpha}]) \equiv \mathfrak{A}(\mathbf{b}[\bar{\alpha}]) \\ &\iff \varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}[\bar{\alpha}])) \equiv \varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{b}[\bar{\alpha}])) \\ &\iff \mathfrak{B}(\mathbf{a}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \equiv \mathfrak{B}(\mathbf{b}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \\ &\iff \mathfrak{B}(\mathbf{A}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \equiv \mathbb{T}. \end{aligned}$$

Нека сега $\mathbf{A} \equiv \mathbf{p}\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_m$ за някой m -местен нелогически предикатен символ \mathbf{p} и термове $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ на \mathcal{L} с променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Тогава предвид инективността на φ и твърдението за термове имаме

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}(\mathbf{A}[\bar{\alpha}]) \equiv \mathbb{T} &\iff (\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1[\bar{\alpha}]), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_m[\bar{\alpha}])) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{A}} \\ &\iff (\varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1[\bar{\alpha}])), \dots, \varphi(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_m[\bar{\alpha}]))) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{B}} \\ &\iff (\mathfrak{B}(\mathbf{a}_1[\overline{\varphi(\alpha)}]), \dots, \mathfrak{B}(\mathbf{a}_m[\overline{\varphi(\alpha)}])) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{B}} \\ &\iff \mathfrak{B}(\mathbf{A}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \equiv \mathbb{T}. \end{aligned}$$

Нека $\mathbf{A} \equiv \neg\mathbf{B}$ за някоя формула \mathbf{B} на \mathcal{L} със свободни променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Тогава

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}(\mathbf{A}[\bar{\alpha}]) \equiv \mathbb{T} &\iff \mathfrak{A}(\mathbf{B}[\bar{\alpha}]) \equiv \mathbb{F} \\ &\iff \mathfrak{B}(\mathbf{B}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \equiv \mathbb{F} \\ &\iff \mathfrak{B}(\mathbf{A}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \equiv \mathbb{T}. \end{aligned}$$

За $\mathbf{A} \equiv \mathbf{B} \vee \mathbf{C}$ разсъждаваме аналогично. Нека накрая $\mathbf{A} \equiv \exists \mathbf{x}\mathbf{B}$ за някоя формула \mathbf{B} на \mathcal{L} със свободни променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ и \mathbf{x} . Нека първо \mathbf{x} е различна от $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Тогава

$$\mathbf{A}[\bar{\alpha}] \equiv \exists \mathbf{x}\mathbf{B}[\bar{\alpha}] \text{ и } \mathbf{A}[\overline{\varphi(\alpha)}] \equiv \exists \mathbf{x}\mathbf{B}[\overline{\varphi(\alpha)}].$$

Нека първо $\mathfrak{A}(\mathbf{A}[\bar{\alpha}]) \equiv \mathbb{T}$. Тогава $\mathfrak{A}(\mathbf{B}[\bar{\alpha}]_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{T}$ за някое $\beta \in |\mathfrak{A}|$. Оттук и индукционното предположение следва, че $\mathfrak{B}(\mathbf{B}[\overline{\varphi(\alpha)}]_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\varphi(\beta)}]) \equiv \mathbb{T}$ и значи $\mathfrak{B}(\mathbf{A}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \equiv \mathbb{T}$. Обратно, нека $\mathfrak{B}(\mathbf{A}[\overline{\varphi(\alpha)}]) \equiv \mathbb{T}$. Тогава $\mathfrak{B}(\mathbf{B}[\overline{\varphi(\alpha)}]_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\varphi(\gamma)}]) \equiv \mathbb{T}$ за някое $\gamma \in |\mathfrak{B}|$. Тъй като φ е сюрекция, то $\gamma = \varphi(\beta)$ за някое $\beta \in |\mathfrak{A}|$, откъдето съгласно индукционното предположение получаваме $\mathfrak{A}(\mathbf{B}[\bar{\alpha}]_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\beta}]) \equiv \mathbb{T}$ и значи $\mathfrak{A}(\mathbf{A}[\bar{\alpha}]) \equiv \mathbb{T}$.

В случай, че \mathbf{x} съвпада с, да речем, \mathbf{x}_i , то махаме \mathbf{x}_i от списъка $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, махаме α_i от списъка $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ и разсъждаваме аналогично на предния случай. □

3.3 Модели. Теорема за валидност

Нека \mathfrak{A} е структура за езика \mathcal{L} и нека \mathbf{A} е формула на \mathcal{L} със свободни променливи измежду $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Конкретизация на \mathbf{A} в \mathfrak{A} ще наричаме всяка формула \mathbf{A}' на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}}$ от вида

$$\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}_{\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n}[\mathbf{i}_{\alpha_1}, \dots, \mathbf{i}_{\alpha_n}],$$

където $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in |\mathfrak{A}|$. Ще казваме, че формулата \mathbf{A} на \mathcal{L} е *вярна (валидна)* в \mathfrak{A} и ще пишем

$$\mathfrak{A} \models \mathbf{A},$$

ако $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') \equiv \mathbb{T}$ за всяка конкретизация \mathbf{A}' на \mathbf{A} в \mathfrak{A} .¹

Лема 3.3. Нека \mathcal{F} е формална система и \mathfrak{A} е структура за $\mathcal{L}(\mathcal{F})$. Тогава всяка логическа аксиома на \mathcal{F} е вярна в \mathfrak{A} .

Доказателство. Нека първо разгледаме една съждителна аксиома $\neg\mathbf{A} \vee \mathbf{A}$. Тогава всяка нейна конкретизация в \mathfrak{A} има вида $\neg\mathbf{A}' \vee \mathbf{A}'$, където \mathbf{A}' е конкретизация на \mathbf{A} в \mathfrak{A} . Но или $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') \equiv \mathbb{T}$, или $\mathfrak{A}(\neg\mathbf{A}') \equiv \mathbb{T}$, и значи $\mathfrak{A}(\neg\mathbf{A}' \vee \mathbf{A}') \equiv \mathbb{T}$. Следователно

$$\mathfrak{A} \models \neg\mathbf{A} \vee \mathbf{A}.$$

Нека сега разгледаме аксиома за субституцията $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}] \rightarrow \exists \mathbf{x}\mathbf{A}$. Всяка нейна конкретизация има вида $\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}'] \rightarrow \exists \mathbf{x}\mathbf{A}'$, където \mathbf{A}' се получава от \mathbf{A} , замествайки всички свободни променливи, различни от \mathbf{x} , с имена на елементи на $|\mathfrak{A}|$, а \mathbf{a}' е затворен терм на $\mathcal{L}(\mathcal{F})_{\mathfrak{A}}$. Ако стойността на $\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}']$ в \mathfrak{A} е \mathbb{F} , то цялата конкретизация приема стойност \mathbb{T} . За това нека предположим, че $\mathfrak{A}(\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}']) \equiv \mathbb{T}$. Нека $\mathfrak{A}(\mathbf{a}') \equiv \alpha$. Тогава $\mathfrak{A}(\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\alpha}]) \equiv \mathbb{T}$, откъдето $\mathfrak{A}(\exists \mathbf{x}\mathbf{A}') \equiv \mathbb{T}$ и значи $\mathfrak{A}(\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}'] \rightarrow \exists \mathbf{x}\mathbf{A}') \equiv \mathbb{T}$. Следователно

$$\mathfrak{A} \models \mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}] \rightarrow \exists \mathbf{x}\mathbf{A}.$$

Всяка конкретизация на аксиомата $x = x$ има вида $\mathbf{i}_{\alpha} = \mathbf{i}_{\alpha}$, която очевидно приема стойност \mathbb{T} и следователно

$$\mathfrak{A} \models x = x.$$

Нека сега да разгледаме аксиомата

$$x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_m = y_m \rightarrow \mathbf{f}x_1 \dots x_m = \mathbf{f}y_1 \dots y_m.$$

Всяка нейна конкретизация има вида

$$\mathbf{i}_{\alpha_1} = \mathbf{i}_{\beta_1} \rightarrow \dots \rightarrow \mathbf{i}_{\alpha_m} = \mathbf{i}_{\beta_m} \rightarrow \mathbf{f}\mathbf{i}_{\alpha_1} \dots \mathbf{i}_{\alpha_m} = \mathbf{f}\mathbf{i}_{\beta_1} \dots \mathbf{i}_{\beta_n}$$

¹ $\mathfrak{A} \models \mathbf{A}$ е еквивалентно на $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_0) \equiv \mathbb{T}$, където \mathbf{A}_0 е универсално затваряне на \mathbf{A} . В частност, ако \mathbf{A} е затворена, то $\mathfrak{A} \models \mathbf{A}$ е еквивалентно на $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) \equiv \mathbb{T}$.

Ако за някое $1 \leq k \leq m$ имаме $\alpha_k \not\equiv \beta_k$, то $\mathfrak{A}(\mathbf{i}_{\alpha_k} = \mathbf{i}_{\beta_k}) \equiv \mathbb{F}$ и тогава цялата конкретизация приема стойност \mathbb{T} . За това нека предположим, че $\alpha_k \equiv \beta_k$ за $1 \leq k \leq m$. Тогава

$$\mathfrak{A}(\mathbf{f} \mathbf{i}_{\alpha_1} \dots \mathbf{i}_{\alpha_n}) \equiv \mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \equiv \mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\beta_1, \dots, \beta_m) \equiv \mathfrak{A}(\mathbf{f} \mathbf{i}_{\beta_1} \dots \mathbf{i}_{\beta_n}).$$

Оттук $\mathfrak{A}(\mathbf{f} \mathbf{i}_{\alpha_1} \dots \mathbf{i}_{\alpha_n} = \mathbf{f} \mathbf{i}_{\beta_1} \dots \mathbf{i}_{\beta_n}) \equiv \mathbb{T}$ и значи цялата конкретизация приема стойност \mathbb{T} . Следователно

$$\mathfrak{A} \models x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_m = y_m \rightarrow \mathbf{f}x_1 \dots x_m = \mathbf{f}y_1 \dots y_m.$$

Аналогично се доказва, че

$$\mathfrak{A} \models x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_m = y_m \rightarrow \mathbf{p}x_1 \dots x_m \rightarrow \mathbf{p}y_1 \dots y_m.$$

за всеки нелогически m -местен предикатен символ \mathbf{p} на \mathcal{F} .

Накрая, да разгледаме аксиомата

$$x_1 = y_1 \rightarrow x_2 = y_2 \rightarrow x_1 = x_2 \rightarrow y_1 = y_2.$$

Всяка нейна конкретизация има вида

$$\mathbf{i}_{\alpha_1} = \mathbf{i}_{\beta_1} \rightarrow \mathbf{i}_{\alpha_2} = \mathbf{i}_{\beta_2} \rightarrow \mathbf{i}_{\alpha_1} = \mathbf{i}_{\alpha_2} \rightarrow \mathbf{i}_{\beta_1} = \mathbf{i}_{\beta_2}.$$

Ако $\alpha_1 \not\equiv \beta_1$, или $\alpha_2 \not\equiv \beta_2$, или $\alpha_1 \not\equiv \alpha_2$, то поне една от предпоставките приема стойност \mathbb{F} и значи цялата конкретизация приема стойност \mathbb{T} . Ако $\alpha_1 \equiv \beta_1$, $\alpha_2 \equiv \beta_2$ и $\alpha_1 \equiv \alpha_2$, то $\beta_1 \equiv \beta_2$, откъдето заключението на конкретизацията приема стойност \mathbb{T} и следователно цялата конкретизация приема стойност \mathbb{T} . Следователно

$$\mathfrak{A} \models x_1 = y_1 \rightarrow x_2 = y_2 \rightarrow x_1 = x_2 \rightarrow y_1 = y_2.$$

□

Дефиниция 3.4. Нека \mathcal{F} е формална система. Ще казваме, че структурата \mathfrak{A} за $\mathcal{L}(\mathcal{F})$ е *модел* на \mathcal{F} и ще пишем

$$\mathfrak{A} \models \mathcal{F},$$

ако в \mathfrak{A} е вярна всяка нелогическа аксиома на \mathcal{F} .

Теорема 3.5 (Валидност). Нека $\mathfrak{A} \models \mathcal{F}$. Тогава за всяка формула \mathbf{A} на \mathcal{F} , ако $\vdash_{\mathcal{F}} \mathbf{A}$, то $\mathfrak{A} \models \mathbf{A}$.

Доказателство. Ще извършим доказателството с индукция по извода на теоремите на \mathcal{F} . Ако теоремата е логическа аксиома, то тя е вярна в \mathfrak{A} съгласно лемата. Ако теоремата е нелогическа аксиома, то тя е вярна в \mathfrak{A} съгласно дефиницията на модел. Нека сега да забележим, че всяка конкретизация на формула $\neg \mathbf{A}$ в \mathfrak{A} има вида $\neg \mathbf{A}'$, където \mathbf{A}' е конкретизация на \mathbf{A} в \mathfrak{A} , а всяка конкретизация на $\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$ има вида $\mathbf{A}' \vee \mathbf{B}'$, където \mathbf{A}' и \mathbf{B}' са конкретизации съответно на \mathbf{A} и \mathbf{B} в \mathfrak{A} . Оттук следва, че ако теоремата е получена въз основа на правилата (ПР), (ПС), (ПА) или (ПО), то можем да докажем, че теоремата е вярна в \mathfrak{A} , аналогично на доказателството на теоремата за валидност на съждителното смятане.

Нека сега теоремата се получава чрез (ПЗ). Тогава тя има вида $\exists \mathbf{x} \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, където $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ е теорема и \mathbf{x} не участва свободно в \mathbf{A} . Всяка конкретизация на $\exists \mathbf{x} \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ има вида $\exists \mathbf{x} \mathbf{A}' \rightarrow \mathbf{B}'$, където \mathbf{B}' е конкретизация на \mathbf{B} , а \mathbf{A}' се получава от \mathbf{A} замествайки свободните променливи, различни от \mathbf{x} , съответно с имената на елементите на \mathfrak{A} , с които са заместени свободните променливи на \mathbf{B} . Ако $\mathfrak{A}(\exists \mathbf{x} \mathbf{A}') \equiv \mathbb{F}$, то стойността на $\exists \mathbf{x} \mathbf{A}' \rightarrow \mathbf{B}'$ е \mathbb{T} . За това нека $\mathfrak{A}(\exists \mathbf{x} \mathbf{A}') \equiv \mathbb{T}$. Тогава $\mathfrak{A}(\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\alpha}]) \equiv \mathbb{T}$ за някое $\alpha \in |\mathfrak{A}|$. Да забележим, че $\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\alpha}] \rightarrow \mathbf{B}'$ е конкретизация на $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ (защото \mathbf{x} не участва свободно в \mathbf{B}). Тогава, тъй като $\mathfrak{A} \models \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, то $\mathfrak{A}(\mathbf{A}'_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}_{\alpha}] \rightarrow \mathbf{B}') \equiv \mathbb{T}$, откъдето $\mathfrak{A}(\mathbf{B}') \equiv \mathbb{T}$ и значи

$$\mathfrak{A}(\exists \mathbf{x} \mathbf{A}' \rightarrow \mathbf{B}') \equiv \mathbb{T}.$$

Следователно

$$\mathfrak{A} \models \exists \mathbf{x} \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}.$$

□

Следствие 3.6. Ако една формална система \mathcal{F} има конкретен краен модел, то \mathcal{F} е непротиворечива. В общия случай, ако \mathcal{F} има модел и ZF е непротиворечива, то \mathcal{F} е непротиворечива.

Доказателство. Нека $\mathfrak{A} \models \mathcal{F}$. Имаме $\mathfrak{A} \models x \neq x$. Оттук и теоремата за валидност $\not\models_{\mathcal{F}} x \neq x$ и следователно \mathcal{F} е непротиворечива. □

Нека $\mathcal{L} \leq \mathcal{L}'$ и нека \mathfrak{A}' е структура за \mathcal{L}' . Ще казваме, че \mathfrak{A} е *обедняване* на \mathfrak{A}' до езика \mathcal{L} , ако \mathfrak{A} и \mathfrak{A}' имат един и същи носител и интерпретират символите на \mathcal{L} по един и същи начин. Ясно е, че всяка затворена формула \mathbf{A}' на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}}$ е формула и на $\mathcal{L}_{\mathfrak{A}'}$ (защото $\mathcal{L} \leq \mathcal{L}'$ и $|\mathfrak{A}| \equiv |\mathfrak{A}'|$) и

$$\mathfrak{A}(\mathbf{A}') \equiv \mathfrak{A}'(\mathbf{A}').$$

Следователно за всяка формула \mathbf{A} на \mathcal{L} е в сила

$$\mathfrak{A} \models \mathbf{A} \iff \mathfrak{A}' \models \mathbf{A}.$$