

Име: _____, ФН: _____, Спец./курс: _____

Задача	1	2	3	4	Общо
получени точки					
максимум точки	16	16	18	0	50

Задача 1 Кубичният граф има 8 върха и 12 ребра (съответно върховете и ръбовете на обикновен куб).

- (a) Нарисувайте този граф така, че ребрата му да не се пресичат.
- (b) Намерете минимално доминиращо множество в графа.
- (c) Намерете максимално независимо множество в графа.
- (d) Намерете максимално съчетание в графа.

Задача 2 Неориентиран граф с n върха съдържа 2 различни хамилтонови цикъла. Докажете, че графът има поне $n + 2$ ребра.

Задача 3 Нека двама играчи, A и B , играят финален мач по снукър, като титлата ще е за играчът, който пръв спечели n игри. Да допуснем, че играчите са еднакво силни, тоест всеки има 50% шанс да спечели всяка отделна игра. Вече са изиграни $i + j$ игри, като A е спечелил i , а B - j игри. Предложете бърз алгоритъм, който да изчислява вероятността A да спечели финала.

Пример: Ако $i = n - 1$ и $j = n - 3$, вероятността A да спечели е $7/8$, тъй като е достатъчно да спечели някоя от следващите 3 игри.

Задача 3 Да означим върховете на куба с $a_1, b_1, c_1, d_1, a_2, b_2, c_2, d_2$.

- (a) рисуваме квадрат a_1, b_1, c_1, d_1 , а вътре в него по-малък квадрат a_2, b_2, c_2, d_2 , после свързваме a_1 с a_2 , b_1 с b_2 и т.н.
- (b) върховете (a_1, c_2) доминират всичките върхове на графа, а един връх не може да доминира всички други, следователно (a_1, c_2) представлява минимално доминиращо множество.
- (c) $\{a_1, c_1, b_2, d_2\}$ е върхово покритие, всяко ребро е покрито от точно един връх от него, следователно е минимално. Останалите 4 върха $\{a_2, c_2, b_1, d_1\}$ ще представляват максимално независимо множество.
- (d) ребрата $(a_1, a_2), (b_1, b_2), (c_1, c_2), (d_1, d_2)$ не се допират и покриват всички върхове, следователно представляват максимално съчетание.

Задача 2 Тъй като графът съдържа 2 хамилтонови цикъла, той има поне $n + 1$ ребра. Да допуснем, че има точно $n+1$ ребра. Нека първият цикъл е $(v_1, v_2 \dots v_n)$. Оставащото ребро е хорда в този цикъл, то свързва два несъседни върха (v_i, v_j) . Вторият цикъл ще мине задължително през него.

Да разгледаме ребрата (v_i, v_{i-1}) и (v_i, v_{i+1}) . Едното от тях ще влезе във втория цикъл, другото няма да е в него, защото през върха v_i минават точно 2 ребра от цикъла.

Да допуснем, че (v_i, v_{i-1}) не е във втория хамилтонов цикъл. Тогава през върха v_{i-1} ще мине само едно ребро - (v_{i-2}, v_{i-1}) и вторият цикъл е невъзможен.

Задача 3 Да дефинираме рекурсивна процедура за изчисляване на вероятността играч A да спечели при вече изиграни $i + j$ игри:

```
P(i,j,n: integer)
1  if i = n
2      return 1
3  if j = n
4      return 0
5  return ½P(i + 1, j, n) + ½P(i, j + 1, n)
```

Тази процедура има 2 аргумента i и j , които заемат стойности между 0 и n . Можем да представим стойностите ѝ в двумерна таблица и да я запълним за време $O(n^2)$:

```
CREATEP(n: integer)
1  Създай масив P[0 … n, 0 … n]
2  for i = 0 to n
3      P[n, i] ← 1
4      P[i, n] ← 0
5  for i = n – 1 downto 0
6      for j = n – 1 downto 0
7          P[i, j] ← ½P[i + 1, j] + ½P[i, j + 1]
```