

3.9 Нестандартни модели на аритметиката

С $T_1(\mathbb{N})$ ще означаваме формалната система с език $\mathcal{L}(PA)$, която има за нелогически аксиоми всички формули \mathbf{A} , за които $\mathbb{N} \models \mathbf{A}$. Нека κ е нова константа и \mathcal{F} се получава от $T_1(\mathbb{N})$, добавяйки κ . Нека $\Gamma \equiv \{\kappa \neq \bar{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ (с \bar{n} означаваме терма $\underbrace{SS \dots S0}_n$). Ще докажем, че $\mathcal{F}[\Gamma]$ има модел. За целта нека $\Gamma' \subseteq \Gamma$ е крайно множество. Нека n_0 е естествено число, такова че ако $\kappa \neq \bar{i} \in \Gamma'$, то $i < n_0$. Нека с \mathbb{N}_{n_0} означим структурата, която се получава от \mathbb{N} , добавяйки интерпретацията

$$\mathbb{N}_{n_0}(\kappa) \equiv n_0.$$

Тогава $\mathbb{N}_{n_0} \models \mathcal{F}$. Освен това, за всяко $i < n_0$ имаме

$$\mathbb{N}_{n_0} \models \kappa \neq \bar{i}$$

и следователно $\mathbb{N}_{n_0} \models \mathcal{F}[\Gamma']$. Оттук и теоремата за компактност $\mathcal{F}[\Gamma]$ има модел и значи е непротиворечива. Тъй като \mathcal{F} не може да има крайни модели, то $\mathcal{F}[\Gamma]$ има безкраен модел и следователно, съгласно теоремата на Льовенхайм-Скулем, $\mathcal{F}[\Gamma]$ има изброим модел \mathfrak{A}' . Нека \mathfrak{A} е обедняването на \mathfrak{A}' до езика $\mathcal{L}(PA)$. Тогава $\mathfrak{A} \models T_1(\mathbb{N})$. Да допуснем, че $\mathbb{N} \cong \mathfrak{A}$ и нека $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{A}|$ е изоморфизъм. Нека $\alpha \in |\mathfrak{A}|$ е такъв, че $\alpha = \mathfrak{A}'(\kappa)$. Нека $\varphi(n) \equiv \alpha$. Тъй като $\mathbb{N}(\bar{n}) \equiv n$ и φ е изоморфизъм, то $\mathfrak{A}(\kappa) \equiv \alpha$ и значи $\mathfrak{A}'(\bar{n}) \equiv \alpha$. Но тогава $\mathfrak{A}' \models \kappa = \bar{n}$, което противоречи на $\mathfrak{A}' \models \mathcal{F}[\Gamma]$. Следователно $\mathbb{N} \not\cong \mathfrak{A}$.

Дефиниция 3.19. Нестандартен модел на аритметиката наричаме всеки изброим модел на $T_1(\mathbb{N})$, който не е изоморфен на \mathbb{N} .

Нека \mathbf{N} е нестандартен модел на аритметиката. Нека

$$N_0 \equiv \{\mathbf{N}(\bar{n}) \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Тъй като $\mathbb{N} \models S\bar{n} = \overline{n+1}$, $\mathbb{N} \models \bar{n} + \bar{m} = \overline{n+m}$ и $\mathbb{N} \models \bar{n} \cdot \bar{m} = \overline{nm}$, то N_0 е затворено относно операциите $S_{\mathbf{N}}$, $+_{\mathbf{N}}$ и $\cdot_{\mathbf{N}}$. Следователно \mathbf{N} има подструктура с носител N_0 . При това, тъй като $\mathbb{N} \models \bar{n} \neq \bar{m}$ за $n \neq m$ и

$$m < n \iff \mathbb{N} \models \bar{m} < \bar{n},$$

то изображението $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow N_0$, действащо по правилото $\varphi(n) \equiv \mathbf{N}(\bar{n})$ е изоморфизъм и значи \mathbf{N} има подструктура N_0 , изоморфна на \mathbb{N} . Елементите на N_0 наричаме стандартни, а останалите елементи на \mathbf{N} — нестандартни. Нека $\alpha \in \mathbf{N}$ е нестандартен елемент. Тъй като

$$\mathbb{N} \models x \not< 0$$

$$\mathbb{N} \models x < \overline{n+1} \rightarrow (x = 0 \vee \dots \vee x = \bar{n}),$$

то $\beta <_{\mathbf{N}} \alpha$ за всеки стандартен елемент β . Следователно всички нестандартни елементи са по-големи от всеки стандартен елемент на \mathbf{N} .

За всеки нестандартен елемент α е в сила $\alpha <_{\mathbf{N}} S_{\mathbf{N}}(\alpha)$ (защото $\mathbb{N} \models x < Sx$), като между α и $S_{\mathbf{N}}(\alpha)$ няма елементи (защото $\mathbb{N} \models \neg \exists y(x < y \ \& \ y < Sx)$). Ясно е, че $S_{\mathbf{N}}(\alpha)$ е нестандартен. Освен това съществува α' , такова че $\alpha \equiv S_{\mathbf{N}}(\alpha')$ (защото $\mathbb{N} \models x \neq 0 \rightarrow \exists y(x = Sy)$). Така всеки нестандартен елемент генерира \mathbb{Z} -верига от нестандартни елементи. Нека H е двуместна операция определена с аксиомата

$$Hx = y \leftrightarrow \exists z(x = \bar{2} \cdot y \vee x = \bar{2} \cdot y + \bar{1}).$$

За \mathbf{N} е в сила, че $H_{\mathbf{N}}(n)$ е цялата част на $\frac{n}{2}$. Тъй като $\mathbb{N} \models x \neq 0 \rightarrow Hx < x$, то $H_{\mathbf{N}}(\alpha)$ е нестандартен елемент, който е по-малък от α и не е от \mathbb{Z} веригата на нестандартния елемент α . Също така $\mathbf{N}(\bar{2}) \cdot_{\mathbf{N}} \alpha$ е нестандартен елемент, който е по-голям от α и не е от \mathbb{Z} веригата на нестандартния елемент α . Освен това, ако $\alpha <_{\mathbf{N}} \beta$ са нестандартни елементи от различни \mathbb{Z} -вериги, то $\alpha <_{\mathbf{N}} H_{\mathbf{N}}(\alpha + \mathbf{N}\beta) <_{\mathbf{N}} \beta$, като $H_{\mathbf{N}}(\alpha + \mathbf{N}\beta)$ не е нито от \mathbb{Z} веригата на α , нито на тази на β . Следователно \mathbb{Z} веригите на нестандартните елементи образуват гъсто наредено множество без най-малък и най-голям елемент. Така доказахме следната теорема.

Теорема 3.20. Нека \mathbf{N} е нестандартен модел на аритметиката. Тогава наредбата на в \mathbf{N} е от тип $\mathbb{N} + \mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$.