

Решения на задачите от първото малко контролно по ДАА на група 5, проведено на 10.04.2024 г.

Задача 1. (50 т.) Дефинираме вълнист масив индуктивно:

- Всеки едноелементен масив е вълнист.
- Масив $A[1 \dots n]$ (където $n > 1$) е вълнист, ако
 1. масивът $A[1 \dots \lfloor \frac{n}{2} \rfloor]$ е сортиран, а
 2. масивът $A[\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \dots n]$ е вълнист.

Да се състави алгоритъм с линейна сложност по време, който приема вълнист масив и го сортира. Коректността на алгоритъма да се обоснове формално и да се изследва сложността по време.

Решение. Решението е проста модификация на алгоритъма за сортиране чрез сливане:

```
1 Sort(A[1..n] - вълнист масив):  
2   if n = 1:  
3     return  
4  
5   Sort(A[ $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \dots n$ ])  
6   Merge(A[1.. $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ ], A[ $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \dots n$ ])
```

Тук `Merge` е алгоритъмът за сливане на сортирани масиви, който е изучаван на лекции. Ще покажем коректността на `Sort` с пълна индукция по n :

- ако $n = 1$, то тогава $A[1..n]$ е сортиран и алгоритъмът коректно веднага ще приключи работа;
- ако $n > 1$, то тогава на ред 5 по ИП ще сортираме вълнистия масив $A[\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1..n]$ и с извикването на ред 6 ще слеем масивите $A[1..\lfloor \frac{n}{2} \rfloor]$ и $A[\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1..n]$, което ще сортира $A[1..n]$.

Времевата сложност се описва със следното рекурентно уравнение:

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n) \text{ (заради извикванията Sort и Merge).}$$

По мастър-теоремата излиза, че $T(n) \asymp n$.

Критерии за оценяване:

- за правилен алгоритъм – 20 точки;
- за доказателство на коректността на алгоритъма – 20 точки;
- за обосновка на сложността по време – 10 точки.

Задача 2. (70 т.) Подредете по асимптотично нарастване следните функции:

$$f_1(n) = n! \quad f_2(n) = \sum_{k=1}^n \ln(k) \quad f_3(n) = \sum_{k=1}^{n^3} \frac{1}{k} \quad f_4(n) = (\ln(n))^{\ln(n)}$$

$$f_5(n) = 3^{n\sqrt{n}} \quad f_6(n) = \sum_{k=1}^{n!} \frac{1}{k^2} \quad f_7(n) = \ln(\ln(n)) \quad f_8(n) = 2^{n^2}.$$

При всяко сравнение на две функции се обосновеете формално.

Решение. Окончателната наредба е следната:

$$f_6(n) \stackrel{(1)}{\asymp} f_7(n) \stackrel{(2)}{\asymp} f_3(n) \stackrel{(3)}{\asymp} f_2(n) \stackrel{(4)}{\asymp} f_4(n) \stackrel{(5)}{\asymp} f_1(n) \stackrel{(6)}{\asymp} f_5(n) \stackrel{(7)}{\asymp} f_8(n).$$

Доказателство:

$$(1) f_7(n) = \ln(\ln(n)) \succ 1 \asymp \sum_{k=1}^{n!} \frac{1}{k^2} = f_6(n).$$

$$(2) f_3(n) = \sum_{k=1}^{n^3} \frac{1}{k} \asymp \ln(n^3) = 3 \ln(n) \asymp \ln(n) \succ f_7(n).$$

$$(3) f_2(n) = \sum_{k=1}^n \ln(k) = \ln(n!) \asymp n \ln(n) \succ \ln(n) \asymp f_3(n).$$

$$(4) f_4(n) = (\ln(n))^{\ln(n)} = n^{\ln(\ln(n))} \succ n \ln(n) \asymp f_2(n).$$

$$(5) \ln(f_1(n)) \asymp n \ln(n) \succ \ln(n) \ln(\ln(n)) \asymp \ln(f_4(n)), \text{ откъдето } f_1(n) \succ f_4(n).$$

$$(6) \ln(f_5(n)) \asymp n\sqrt{n} \succ n \ln(n) \asymp \ln(f_1(n)), \text{ откъдето } f_5(n) \succ f_1(n).$$

$$(7) \ln(f_8(n)) \asymp n^2 \succ n\sqrt{n} \asymp \ln(f_5(n)), \text{ откъдето } f_8(n) \succ f_5(n).$$

Критерии за оценяване:

- за всяко правилно сравнение от (1) до (7) – по 5 точки;
- за обосновка на всяко сравнение от (1) до (7) – по 5 точки.